Télechargement: www.tawjihnet.net

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2012
عناصر الإجابة

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

المادة	علوم الحياة والأرض	RR36	المعامل 3
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم الرياضية (أ)		مدة الإنجاز 2

" قبول كل إجابة صحيحة ذات صياغة لغوية سليمة بالنسبة لكل سؤال"

التمرين الأول (4 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
	تعريف المحتوى الجيني : هو جينوم وراثي للساكنة، ويتكون من مجموع الأنماط الوراثية للأفراد المنتمين لهذه الساكنة.	0.5 ن
	تعريف الهجرة: هي ظاهرة طبيعية تؤدي إلى انتقال الحليلات عبر انتقال الأفراد بين ساكنات متباعدة من نفس النوع.....	0.5 ن
	تعريف الطفرة الوراثية: تغيرات مفاجئة في المادة الوراثية، تساهم في التجديد والتغير الوراثي للساكنة.	0,5 ن
	أنواع الطفرات ودورها:	
	- الطفرات الموضعية (الحليلية) : تغير في مستوى النيكليوتيدات (ضياع، استبدال، إضافة، انتقال).....	0.5 ن
	- الطفرات الصبغية: تغير في عدد أو بنية الصبغيات (زيادة أو نقصان)،.....	0.5 ن
	- تعد الطفرات ذات أهمية كبيرة في إغناء المحتوى الجيني للساكنة حينما تؤدي إلى إنتاج حليلات ومظاهر خارجية جديدة.	0,5 ن
	أهمية الهجرة: تؤدي الهجرة متعددة الاتجاهات إلى تغيير البنية الوراثية للساكنات المستقبلة، وذلك من خلال الرفع من المظاهر الخارجية عبر وصول حليلات جديدة من ساكنات بعيدة. وينتج عن ذلك تخليط وراثي بين ساكنات متباعدة يؤدي في الأخير إلى تقليص التباين بين هذه الساكنات، وبالتالي توجهها نحو ساكنات متوازنة.....	1 ن

التمرين الثاني (5 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
1	تمثل الظاهرة X الانقسام الاختزالي نظرا لإنتاجها لخلايا أحادية الصيغة الصبغية.....	0.25 ن
	الطور (أ): التمهيدية I: تشكل الرباعيات.....	0.25 ن
	الطور(ب): الانفصالية II: الهجرة القطبية وكل صبغي مكون من صبيغي واحد.....	0.25 ن
	الطور (ج): الانفصالية I: الهجرة القطبية وكل صبغي مكون من صبيغيين.....	0.25 ن
	الطور (د): النهائية II: خلية بصبغي منفرد مكون من صبيغي واحد.....	0.25 ن
	الخلية(a):n لأنها نتجت إثر الانقسام الاختزالي (الظاهرةX) للخلية (d).....	0.25 ن
	الخليتان (b) و (c):n لأنهما نتجتا عن التكاثر الخلوي للخلية a؛.....	0.25 ن
	الخلية(d):n 2 لأنها نتجت عن التحام خليتين (c) و(b) خلال الإخصاب؛.....	0.25 ن
2	نمط الدورة الصبغية لطحلب ***Chlamydomonas*** هو دورة أحادية الصيغة الصبغية.....	0.5 ن
	• لأن المرحلة 2n تدوم فترة قصيرة من دورة النمو، والانقسام الاختزالي يحدث مباشرة بعد الإخصاب.....	0.5 ن
3	إنجاز سليم لدورة **أحادية الصيغة الصبغية** مع إبراز تموضع كل من **الانقسام الاختزالي** و**الإخصاب** وتموضع المرحلتين **الأحادية** و**الثنائية الصيغة الصبغية**.....	2 ن

لمزيد من المواضيع منتديات توجيه نت ـ الدراسة بالسنة 2 باك

Télechargement: www.tawjihnet.net

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
	التمرين الثالث (5 نقط)	
1. أ	يتعلق الأمر بهجونة ثنائية لأن التزاوج تناول صفتين وراثيتين: شكل الزغب وشكل العيون. تم الحصول في الجيل F_1 على 100% من فئران كلها ذات **زغب مجعد وعيون عادية** ، وبالتالي القانون الأول لماندل قد تحقق ، فالآباء من سلالات نقية، والحليل المسؤول عن زغب مجعد F سائد على الحليل المسؤول عن زغب أملس f. والحليل المسؤول عن عيون عادية M سائد على الحليل المسؤول عن عيون مشوهة m.	**1 ن**
1. ب	- نرمز للحليل المسؤول عن زغب مجعد ب F وللحليل المسؤول عن زغب أملس بـ f . - ونرمز للحليل المسؤول عن عيون عادية بـ M وللحليل المسؤول عن عيون مشوهة بـm. أفراد F1 هجناء يحملون الحليلين المختلفين لكل مورثة. هناك نمطان وراثيان ممكنان لهؤلاء الأفراد: حالة مورثتين مستقلتين: $\frac{F}{f}\ \frac{m}{M}$ حالة مورثتين مرتبطتين: $\frac{f\ M}{F\ m}$	**1 ن**
2	بما أن التزاوج الثاني أعطى الجيل F2 المكون من: – 50 فأرا بزغب أملس وعيون عادية (3/16) ؛ - 49 فأرا بزغب مجعد وعيون مشوهة (3/16)؛ – 152 فأرا بزغب مجعد وعيون عادية (9/16)؛ - 18 فأرا بزغب أملس وعيون مشوهة (1/16) ؛ فإن الحليلين مستقلان.(القانون الثالث لـ Mendel).....	**0.5 ن**

F1 × F1

- **النمط الوراثي**

$\frac{F}{f}\ \frac{m}{M}$ × $\frac{F}{f}\ \frac{m}{M}$

- **الأمشاج:** $\frac{F}{}\ \frac{m}{}$ (1/4) ; $\frac{F}{}\ \frac{M}{}$ (1/4) ; $\frac{f}{}\ \frac{m}{}$ (1/4) ; $\frac{f}{}\ \frac{M}{}$ (1/4) **0.5 ن**

شبكة التزاوج:

♀ \ ♂	$\frac{F}{}\ \frac{m}{}$ 1/4	$\frac{F}{}\ \frac{M}{}$ 1/4	$\frac{f}{}\ \frac{m}{}$ 1/4	$\frac{f}{}\ \frac{M}{}$ 1/4
$\frac{F}{}\ \frac{m}{}$ 1/4	$\frac{F}{F}\ \frac{m}{m}$ [F ; m] 1/16	$\frac{F}{F}\ \frac{m}{M}$ [F ; M] 1/16	$\frac{F}{f}\ \frac{m}{m}$ [F ; m] 1/16	$\frac{F}{f}\ \frac{m}{M}$ [F ; M] 1/16
$\frac{F}{}\ \frac{M}{}$ 1/4	$\frac{F}{F}\ \frac{M}{m}$ [F ; M] 1/16	$\frac{F}{F}\ \frac{M}{M}$ [F ; M] 1/16	$\frac{F}{f}\ \frac{M}{m}$ [F ; M] 1/16	$\frac{F}{f}\ \frac{M}{M}$ [F ; M] 1/16
$\frac{f}{}\ \frac{m}{}$ 1/4	$\frac{f}{F}\ \frac{m}{m}$ [F ; m] 1/16	$\frac{f}{F}\ \frac{m}{M}$ [F ; M] 1/16	$\frac{f}{f}\ \frac{m}{m}$ [f ; m] 1/16	$\frac{f}{f}\ \frac{m}{M}$ [f ; M] 1/16
$\frac{f}{}\ \frac{M}{}$ 1/4	$\frac{f}{F}\ \frac{M}{m}$ [F ; M] 1/16	$\frac{f}{F}\ \frac{M}{M}$ [F ; M] 1/16	$\frac{f}{f}\ \frac{M}{m}$ [f ; M] 1/16	$\frac{f}{f}\ \frac{M}{M}$ [f ; M] 1/16

نسب المظاهر الخارجية 9/16 [F ; M] 3/16 [f ; M] 3/16 [F; m] 1/16 [f ; m]

(152) (49) (50) (18)

تطابق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية **2 ن**

لمزيد من المواضيع منتديات توجيه نت ـ الدراسة بالسنة 2 باك

Télechargement: www.tawjihnet.net

التمرين الرابع 6 نقط)

السؤال	عناصر الإجابة	النقطة
1	- التمثيل الصحيح للمدراج و مضلع الترددات  	1 ن
2	**حساب الثابتات:** - المعدل الحسابي : $\bar{X}$ = .. 201.5 kg ..... - الانحراف المعياري: σ = √v = 13.14 ..... - مجال الثقة : [188.36 ; 214.64]..... التمثيل على المبيان.....	0.5 ن 0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن
3	- يتبين من الوثيقة2 أن مضلع التردادات ثنائي المنوال مما يدل على عدم تجانس العينة الثانية.	0.5 ن
4	- مقارنة توزيع العينتين: **العينة 1** • مضلع وحيد المنوال • معدل إنتاج الحليب = 201.5 kg..... **العينة 2 :** • مضلع متعدد المنوال معدل إنتاج الحليب = 171.5 kg - العينة 1 أقل تشتتا من العينة 2. ..... - مردودية إنتاج الحليب عند العينة 1 تفوق المردودية عند العينة 2.....	0.5 ن 0.5 ن 0.25 ن
5	أ - العينة الأولى ناتجة عن انتقاء اصطناعي خضعت له العينة الثانية نظرا لكون: • تدخل أقسام العينة الأولى ضمن مجال أقسام العينة الثانية,,..... • وجود تطابق بين مضلع التردادات ل لعينة الأولى والنصف الثاني من مبيان العينة الثانية (حيث ترتفع معدلات إنتاج الحليب)..... ب – الانتقاء فعال لأنه مكن من عزل نعاج ذات مردودية مرتفعة من الحليب.....	0,75 ن 0,75 ن 0.5 ن

لمزيد من المواضيع منتديات توجيه نت ـ الدراسة بالسنة 2 باك